

ZWANGERSCHAP, VRUCHTBAARHEID, BORSTVOEDING

Gebruik Ferriprox niet als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of als u borstvoeding geeft. Ferriprox kan de baby ernstige schade toebrengen. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft tijdens uw behandeling met Ferriprox, dient u onmiddellijk uw arts in te lichten en medisch advies in te winnen.

Vrouwen die zwanger kunnen worden, wordt aanbevolen effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens hun behandeling met Ferriprox en gedurende 6 maanden na de laatste dosis. Mannen wordt aanbevolen effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens hun behandeling en gedurende 3 maanden na de laatste dosis. Vraag uw arts welke methode het meest geschikt is voor u.

KTMC00013.02

4

PATIËNTENKAART**Belangrijke veiligheidsherinneringen voor patiënten die Ferriprox (deferipron) gebruiken**

Voorschrijvend arts: _____

Tel.: _____

1

CONTROLE VAN HET AANTAL WITTE BLOEDCELLEN ALS U FERRIPROX GEBRUIKT

Er is een kleine kans dat u agranulocytose ontwikkelt (erg laag aantal witte bloedcellen) terwijl u Ferriprox gebruikt. Dit kan tot een ernstige infectie leiden. Hoewel agranulocytose slechts bij 1 tot 2 op de 100 gebruikers optreedt, is het belangrijk dat uw bloed regelmatig gecontroleerd wordt.

2

Zorg dat u het volgende doet:

1. Laat uw bloed wekelijks controleren tijdens uw eerste behandeljaar met Ferriprox. Daarna zal uw arts u adviseren over de frequentie ervan.
2. Als u verschijnselen van een infectie ontwikkelt, zoals koorts, keelpijn of griepachtige verschijnselen, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Het aantal witte bloedcellen moet binnen 24 uur gecontroleerd worden om te kijken of u mogelijk agranulocytose heeft.

3